

alimentação por sonda!

Oi! Quero te contar tudo sobre



Minha família estava bem preocupada por que eu perdi peso e não tinha

comer e me sentia muito fraco.

Eu fiquei muito doente, não conseguia

vontade de brincar.



Para eu me sentir melhor,

alimentação.

precisei usar uma sonda de



todos os nutrientes que o meu corpo precisa para ficar saudável.

A minha comida agora fica

dentro de um frasco e lá tem



TNE



Sinto que estou mais forte e com mais energia.







Também consigo

mesmo lugar.

receber água pelo



Fico feliz por saber que estou

crescendo e me sentindo bem

mais forte com a Terapia

**Nutricional Enteral!** 

**CUIDADORES** 

### A Terapia Nutricional Enteral via sonda ou gastrostomia é uma maneira de proporcionar ao organismo da criança ou adolescente a nutrição que ele necessita quando não é possível manter a alimentação por via oral ou quando só a alimentação por via oral não é suficiente para manter ou atingir um peso adequado.

Trata-se de uma dieta realizada por meio de um tubo flexível (sonda) inserida por uma das narinas ou colocada diretamente no estômago ou intestino. Essa dieta é ofertada na forma líquida e apresenta nutrientes similares aos alimentos consumidos pela boca, contendo tudo que a criança ou adolescente necessita diariamente (carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais, fibras e água).

SERINGA

Os equipamentos necessários para a administração da dieta



enteral são:

Lave bem as mãos com água e sabão antes de iniciar o preparo e a administração da dieta.

# **EQUIPO**

### 1. Dieta industrializada em pó: Dilua a quantidade de medidas da dieta em água (filtrada ou fervida) na temperatura ambiente de acordo com a quantidade prescrita.

**TIPOS DE DIETA** 





**TNE** 

## Durante a administração da dieta é importante que o gotejamento seja lento.

TNE

ATENÇÃO!

criança).

Instalar a dieta para gotejar



# de maneira rápida pode provocar vômitos e diarréia.


Durante toda a administração da dieta, manter a criança sentada

ou na cama de forma elevada (colocar travesseiros nas costas da

Após o término da dieta, deixar a criança ou adolescente ainda

com a cabeceira elevada por no mínimo 30 minutos.

Obs.: A posição elevada diminui comprovadamente risco de **REFLUXO** gastroesofágico e aspiração pulmonar.





Presidente Superintendente Executiva Francisco Claudio Duda Valdenize Tiziani

Vice-presidente

Adézio de Almeida Lima

Carla Pintas Marques

Evanir Alves dos Santos

Brás Ferreira Machado

Charles Franklin Ferreira dos Santos

José Tadeu dos Santos Palmieri

Tånia Maria Nava Marchewka

**@icipe** 

Conselho de Administração


oral ou para recuperação do estado nutricional.

enquanto a criança não conseguir comer tudo que precisa por via

Janete Ana Ribeiro Vaz Diretora Clínica Maria Angela Marini Vieira Ferreira Elisa Carvalho Maria Giória Guimarães Santos Diretora de Ensino e Pesquisa Conselho Fiscal Valdenize Tiziani Clenio Severio Teribele Luiz Gustavo Braz Lage Diretora de Recursos Humanos Lúcio Tameirão Machado Vanderli Frare Diretora Técnica Comité de Compliance



TNE





Nádia Dias Gruezo

Arthur Santos

Secretaria de GOVERNO DO

Julyanna Marques Rollm de Lima

Diretor Administrativo e Financeiro

Diretora de Práticas Assistenciais

Gerente de Comunicação e Mobilização

Genésio Vicente

Simone Prado

Isis Magalhães

Claudia Miani