

INDICAÇÕES CLÍNICAS MAIS FREQUENTES PARA AD2/AD3		
<p>Selecione uma ou mais das seguintes opções para definir a principal indicação clínica do paciente.</p>	<p><input type="checkbox"/> Condição de saúde crônica agudizada que requeira atendimento multiprofissional no domicílio, com foco no melhor controle de sintomas causados pela condição de base, incluindo situações de cuidados paliativos.</p> <p><input type="checkbox"/> Lesão de pele de difícil manejo pela equipe assistente que requeira avaliação semanal em domicílio, além do possível uso de coberturas especiais.</p> <p><input type="checkbox"/> Reabilitação multiprofissional com possibilidade de ganho funcional, especialmente após cirurgia de grande porte, evento agudo, fratura ou hospitalização prolongada.</p> <p><input type="checkbox"/> Uso de antibioticoterapia parenteral domiciliar ou outra medicação parenteral seriada, desde que haja mínima estabilidade clínica para permanência no domicílio.</p> <p><input type="checkbox"/> Prematuridade e baixo peso em bebês com necessidade de ganho ponderal.</p> <p><input type="checkbox"/> Nenhuma das condições acima.</p>	
SISTEMA DE PONTUAÇÃO		
INDICAÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS OU GATILHOS		Pontuação
<p>Selecione uma ou mais das opções a seguir. (A presença de qualquer uma delas já classifica o usuário como AD2 ou AD3, INDEPENDENTE DA PONTUAÇÃO FINAL).</p>	<p><input type="checkbox"/> AD2: Necessidade diária de curativos complexos e/ou medicação parenteral (IM/EV/SC - exceto insulina) – 5 pontos</p> <p><input type="checkbox"/> AD3: Necessidade de tratamentos de alta complexidade ou intensidade no domicílio: transfusão sanguínea, paracentese, nutrição parenteral, cuidados paliativos sequenciais para manejo de sintomas mal controlados, dentre outros E/OU uso de Ventilação Mecânica Invasiva – 5 pontos</p>	
USO DO SISTEMA DE SAÚDE		Pontuação
<p>Histórico de internação hospitalar nos últimos três meses.</p>	<p><input type="checkbox"/> Nenhuma internação hospitalar nos últimos 3 meses – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Pelo menos uma internação hospitalar nos últimos 3 meses – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Duas ou mais internações hospitalares nos últimos 3 meses – 2 pontos</p> <p><input type="checkbox"/> Pelo menos uma internação em UTI nos últimos 3 meses – 4 pontos</p>	
<p>Frequência de procura por serviços de urgência nos últimos três meses (SAMU, UPA, Pronto-Socorro)</p>	<p><input type="checkbox"/> Nenhuma procura por serviço de urgência nos últimos 3 meses – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Procurou por serviço de urgência 02 vezes nos últimos 3 meses – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Procurou por serviço de urgência de 03 a 04 vezes nos últimos 3 meses – 2 pontos</p> <p><input type="checkbox"/> Procurou por serviço de urgência 05 ou mais vezes nos últimos 3 meses – 3 pontos</p>	
<p>Tempo de permanência hospitalar nos últimos três meses. Considerar o maior período no caso de múltiplas internações prévias.</p>	<p><input type="checkbox"/> Sem história de internação prévia – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Até 07 dias – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> De 07 a 30 dias – 2 pontos</p> <p><input type="checkbox"/> Mais de 30 dias – 3 pontos</p>	
VULNERABILIDADE SOCIAL		Pontuação
<p>Relação morador-cômodo: dívida o número demoradores pelo número de cômodos, selecionando a opção apropriada.</p>	<p><input type="checkbox"/> Menor que 01 – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Igual a 01 – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Maior que 01 – 2 pontos</p>	
SUPORTE FAMILIAR/CUIDADO		Pontuação
<p>Identifique o suporte de cuidado, seja da família ou de cuidadores.</p>	<p><input type="checkbox"/> Paciente com suporte familiar adequado – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Paciente com suporte familiar inadequado – 1 ponto</p>	
FUNCIONALIDADE		Pontuação
Preencha este campo considerando a idade do paciente, para posterior identificação do grau de dependência, de acordo com sua faixa etária.		
<p>Para crianças de até 07 anos</p>	<p>Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor</p>	<p><input type="checkbox"/> Acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Não acompanha o desenvolvimento neuropsicomotor – 6 pontos</p>
<p>Para crianças maiores de 07 anos, adultos e idosos</p>	<p>Capacidade para tomar banho</p>	<p><input type="checkbox"/> Independente – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Dependente parcial – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Dependente completo – 2 pontos</p>
	<p>Capacidade para alimentar-se</p>	<p><input type="checkbox"/> Independente – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Dependente parcial – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Dependente completo – 2 pontos</p>
	<p>Capacidade para locomover-se</p>	<p><input type="checkbox"/> Independente – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Dependente parcial – 1 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Dependente completo – 2 pontos</p>
POLIFARMÁCIA		Pontuação
<p>Uso de cinco ou mais medicações de uso contínuo, diariamente</p>	<p><input type="checkbox"/> Não – 0 ponto</p> <p><input type="checkbox"/> Sim – 1 ponto</p>	
PONTUAÇÃO FINAL		
Modalidade AD		Pontuação no instrumento
AD1		Até 09 pontos
AD2		De 10 a 15 pontos
AD3		Maior ou igual a 16 pontos